

# 中国新分布的蕨类

王伯蓀  
(生物学系)

## 两歧莎草蕨

*Schizaea dichotoma* (L.) Sm., Mem. Ac. Turin 5:422, t.9.1793; Tard. -Blot et Chr. in Fl. Indo-Chine VII:ii (1939)43; Holt. in Fl. Mal. II, Ferns Mal. 51 (1954) Fig. 6. — *Acrotichum dichotoma* L., Sp. Pl. II. (1753) 1068.

广东: 海南岛, 东澳, 灌丛草地, 黄培佑 269, 1964年6月8日。

分布: 广东海南; 马达加斯加, 波内利西亚, 澳大利亚, 马来亚及越南等地。

## 两歧抱树莲

*Drymoglossum piloselloides* (L.) Presl var. *platycerioides* Teruya, Acta. Phytotax. et Geobot. 1, no. 2. 1932; Holt. in Fl. Mal. II, Ferns Mal. 150 (1954).

广东: 海南岛, 红毛山, 曾怀德、冯钦552, 1929年7月22日。

分布: 广东海南; 印度印尼亚, 新加坡及马来亚等地。

## The New Distribution of Ferns in China

Wang Bosun

### Abstract

The discovery of tow ferns for the first time in China—*Schizaea dichotoma* (L.) Sm. and *Drymoglossum piloselloides* (L.) Presl var. *platycerioides* Teruya were found in Hainan Island.