

# 红領綠鸚鵡在我国新近发现

## (*Psittacula Krameri borealis* Neumann)

邓巨燮 关贯勋  
(生物学系)

红領綠鸚鵡是一种羽色艳丽的观赏鸟。其上体主要为鲜绿色，项部具一粉红色的半环；从鼻孔至眼有一线黑色；頰部的黑色向颈的两侧延伸而与红色半环的左右端相接。

这种鸟已知有六个亚种，其模式亚种产于非洲。*P.K.borealis* Neumann 这一亚种在世界范围内主要分布于锡金至印度阿萨姆的极东部和南部，东孟加拉、缅甸；过去有人指称曾见于我国东南部；据Vaughan & Jones (1913)报导 Fortune 于1849年间在广州采得一只，在梧州可能见过。这种鸟在香港、澳门为留鸟。

1980年10月，我们在珠海市的万山群岛采到了雄鸟一只，经鉴定为本亚种（上、下咀均为珊瑚红色）。其衡量度为：体重108克，全长310，咀峰长24，翅长172，尾长172（折断），跗蹠长16毫米。采集时首先发现一对在一稀疏小树林附近来回飞翔，待落到树冠时射落，剖检结果，胃及食道内均充满野生植物果实的种子。

据我们所到岛屿的群众反映，这种鸚鵡在外伶仃、内伶仃、三灶岛等地都有所见。显然这种鸚鵡是自南向北扩布的，是热带型的种类，珠江口岛屿目前看来似是它们扩布的北限。我们采到的是国内仅有的一号标本。

### 主要参考文献

- [1] 郑作新，中国鳥类分布名录，科学出版社，1976。
- [2] Baker, S., The fauna of British India, including Ceylon and Burma, Birds, 1927, 4, 201—204.
- [3] Peters, J. L., Check-list of birds of the world. 1937, vol. 3.
- [4] Vaughan, R. E. & K.H.Jones, The birds of Hong Kong, Macao, and the West River or Si-Kiang in South-east China, with special reference to their nidification and seasonal movements, Ibis 10(1913), 1, 191.