

非綫性微分方程組的解的 有界性和穩定性

周之銘

(數學力學系)

摘 要

本文討論 n 維方程組(1.1)。在假設(1.4)與(1.5)之下,得基本定理——若方程(2.7)的最大解可延拓,則方程組(1.1)的解的范不超過它,且也可延拓。由此給出(1.1)的解的有界性和穩定性的判別法,這概括了一系列的有關結果,如文獻[1]、[2]、[3]、[6]、[16]、從而看出這些結果的相互關係。

§1 引 言

本文討論 n 維微分方程組

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x + f(t, x) \quad x(t_0) = x_0 \quad (1.1)$$

的解的有界性和穩定性,其中 $A(t)$ 是 $t \geq t_0 \geq 0$ 的 $n \times n$ 連續矩陣, $f(t, x)$ 是 $t \geq t_0$, $D = \{x \mid |x| < H\} \subset R^n$ 上的連續向量函數,這裡 $|\cdot|$ 代表 n 維空間的任意一種模。

關於(1.1)的解的有界性和穩定性, Bellman^[2] Coddington^[1] 李岳生^[6]等人應用積分不等式獲得了很多結果,但對 $f(t, x)$ 都附加了不少特殊的限制; Lakshmikanth^[9] Brauer^[12]等人應用微分不等式也得到了若干結果,可惜一般只能在 $A(t) \equiv 0$ 的情況下得到; Brauer^[13]應用 V 函數和微分不等式相結合的辦法,克服了單純應用微分不等式所存在的局限性,使得討論的方程範圍有所擴大,但由於 V 函數的引進

本文於1965年8月4日收到。

* 本文得到胡金昌教授經常的熱情的鼓勵和指導,並承審閱原稿。作者在此表示衷心的感謝。

又出現了新的局限。本文所用方法避免了應用 Γ 函數及微分不等式的某些局限性，並且將積分不等式方法加以統一和推廣，使討論方程範圍擴大。

本文在 § 2 中首先證明一個引理(基本不等式)，然後利用之證明基本定理，它是本文的主要工具。跟着應用基本定理在 § 3, § 4 中給出解的有界性和穩定性的相當廣泛的判別法，它概括了一系列的有關結果^{[1][2][3][6]}，從而看出這些結果之間的內部聯繫。本文也獲得了 Stokes^[6] 應用局部凸拓撲綫性空間的 Tychonoff 不動點原理得到的類似結果，細心的讀者不難看出兩文結果的差別。

方程(1.1)的解可以寫成

$$x(t) = Y(t_0, t)x_0 + \int_{t_0}^t Y(t_0, t)[Y(t_0, \tau)]^{-1}f(\tau, x(\tau))d\tau \quad (1.2)$$

其中 $Y(t_0, t)$ 是(1.1)所對應的綫性微分方程組

$$\frac{dy}{dt} = A(t)y \quad (1.3)$$

的標準基解矩陣。

我們假設

$$|Y(t_0, t)[Y(t_0, \tau)]^{-1}| \leq K e^{\int_{\tau}^t \lambda(t)dt} \quad t \geq \tau \geq t_0 \quad (1.4)$$

這裡 $K \geq 1$ 是常數， $\lambda(t)$ 是 $t \geq t_0$ 的連續函數。

關於條件(1.4)，我們可以引進如下附注：

附注1.^[7] 若向量 x 的模分別取成

$$|x|_1 = \max_i |x_i|, \quad |x|_2 = \sum_i |x_i| \quad |x|_3 = (\sum_i x_i^2)^{\frac{1}{2}}$$

則方程(1.2)的標準基解矩陣 $Y(t_0, t)$ 滿足

$$|Y(t_0, t)[Y(t_0, \tau)]^{-1}|_i \leq e^{\int_{\tau}^t \lambda_i(t)dt} \quad (i=1, 2, 3, \quad t \geq \tau \geq t_0)$$

其中

$$\lambda_1(t) = \max_i \left\{ \operatorname{Re} a_{ii}(t) + \sum_{j \neq i} |a_{ij}(t)| \right\}$$

$$\lambda_2(t) = \max_j \left\{ \operatorname{Re} a_{jj}(t) + \sum_{i \neq j} |a_{ji}(t)| \right\}$$

$$\lambda_3(t) = \frac{1}{2} (A(t) + A^T(t)) \text{ 的最大特征數, } A^T(t) \text{ 是 } A(t) \text{ 的轉置矩陣。}$$

附注2. 若 $A(t) \equiv A$ ——常矩陣，則(1.4)中的 $\lambda(t)$ 可以取為常數，特別當 A 的特征根的實部全為負時， $\lambda(t)$ 可以取為某一負常數 λ ；當(1.2)的解有界時， $\lambda(t)$ 可

以取为 0。

附注3. (1.4)中, $\lambda(t)=0$ 的充分条件, [3]中有一系列的討論, 例如(1.2)的解有界又 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{t_0}^t \text{tr}A(t)dt > -\infty$

我們假設 $f(t, x)$ 滿足条件

$$|f(t, x)| \leq G(t, |x|) \quad t \geq t_0 \quad x \in D \subset I^n \quad (1.5)$$

其中 $G(t, \gamma)$ 在 $t \geq t_0, 0 \leq \gamma < H$ 上連續, 且对固定的 t 是 γ 單調不降函数。

当 $x_0 \in D$ 时, 由(1.2), (1.4)和(1.5), 在 $x(t)$ 存在的区間上有不等式

$$|x(t)| \leq K |x_0| e^{\int_{t_0}^t \lambda(t)dt} + K \int_{t_0}^t e^{\int_{\tau}^t \lambda(\xi)d\xi} G(\tau, |x(\tau)|) d\tau \quad (1.6)$$

§2 基本定理的建立

我們首先证明如下

引理(基本不等式)

$$\text{設 } \gamma(t) \leq \gamma_0 e^{\int_{t_0}^t \lambda(t)dt} + \int_{t_0}^t e^{\int_{\tau}^t \lambda(\xi)d\xi} G(\tau, \gamma(\tau)) d\tau \quad (2.1)$$

其中 $\gamma(t), \lambda(t)$ 是 $[t_0, t_0+a]$ 上的連續函数, $G(t, \gamma)$ 連續于閉域

$$\Omega = \left\{ t_0 \leq t \leq t_0 + a, \left| \gamma - \gamma_0 e^{\int_{t_0}^t \lambda(t)dt} \right| \leq b \right\} \quad a, b > 0 \text{ 是常数。 当}$$

$t \in [t_0, t_0+a]$ 时, $(t, \gamma(t)) \in \Omega, G$ 对固定的 t 是 γ 的單調不降函数, 則在 $t_0 \leq t \leq t_0+h$ 上

$$\gamma(t) \leq y(t)$$

这里 $y(t)$ 是方程

$$\frac{dy}{dt} = \lambda(t)y + G(t, y) \quad (2.2)$$

經過点 (t_0, γ_0) 的最大解, $h = \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}$,

$$M = \max_{t \in [t_0, t_0+a]} e^{\int_{t_0}^t \lambda(t)dt} \cdot \max_{(\tau, \gamma) \in \Omega} e^{\int_{\tau}^{t_0} \lambda(\xi)d\xi} |G(\tau, \gamma(\tau))|$$

証明. 令

$$y_0(t) = \gamma(t) \quad (2.3)$$

$$y_n(t) = \gamma_0 e^{\int_{t_0}^t \lambda(t) dt} + \int_{t_0}^t e^{\int_{\tau}^t \lambda(\xi) d\xi} G(\tau, y_{n-1}(\tau)) d\tau \quad n=1, 2, \dots$$

用数学归纳法容易证明：对一切 n ， $y_n(t)$ 在 (t_0, t_0+h) 上存在、连续且

$$|y_n(t) - \gamma_0 e^{\int_{t_0}^t \lambda(t) dt}| \leq b$$

由于 G 的单调性及(2.1)，应用归纳法得

$$\gamma(t) = y_0(t) \leq y_1(t) \leq y_2(t) \leq \dots \quad (2.4)$$

注意到：

$$y'_n(t) = \lambda(t) e^{\int_{t_0}^t \lambda(t) dt} \left[\gamma_0 + \int_{t_0}^t e^{\int_{\tau}^t \lambda(\xi) d\xi} G(\tau, y_{n-1}(\tau)) d\tau \right] + G(t, y_{n-1}(t))$$

因为在 $[t_0, t_0+h]$ 上

$$|y'_n(t)| \leq C \quad \text{其中 } C \text{ 是某一常数}$$

这样在 $[t_0, t_0+h]$ 上

$$|y_n(t) - y_n(\bar{t})| = |y'_n(\bar{t})| |t - \bar{t}| \leq C |t - \bar{t}| \quad (2.5)$$

其中 \bar{t} 介于 t 与 \bar{t} 之间；

$$|y_n(t)| \leq \gamma_0 e^{\int_{t_0}^t \lambda(t) dt} + b \quad (2.6)$$

由(2.5)，(2.6)推知 $\{y_n(t)\}$ 在 $[t_0, t_0+h]$ 上等度连续，一致有界。根据Arzela定理及(2.4)就知

$$y_n(t) \rightarrow y^*(t) \in C \quad \text{当 } t \in [t_0, t_0+h]$$

对(2.3)两边取极限，就有

$$y^*(t) = \gamma_0 e^{\int_{t_0}^t \lambda(t) dt} + \int_{t_0}^t e^{\int_{\tau}^t \lambda(\xi) d\xi} G(\tau, y^*(\tau)) d\tau$$

即 $y^*(t)$ 是(2.2)的过点 (t_0, γ_0) 的解，由此及(2.4)，再注意到 $y(t)$ 是(2.2)的过点 (t_0, γ_0) 的最大解，就有

$$\gamma(t) \leq y(t) \quad t \in [t_0, t_0+h]$$

引理得证。

附注1. 引理也可以利用微分不等式^[4]证明，不过我们还是利用逐次逼近法

直接給出證明。

附注2. 令 $\lambda(t)=0$ ，就得Vidwanatham^[11]的結果。適當選取 $G(t, \gamma)$ 可以得到Bellman^[1] B'hari^[8] Langenhop^[10]及李哲生^[5]等一系列的積分不等式。因而引理可以看作是花樣繁多的各種積分不等式的統一形式，從而使我們看出了它們之間的內部聯系。

附注3. 關於 $G(t, \gamma)$ 的連續性假設可以放寬，只要 G 對固定的 t 是 γ 的連續函數，對固定的 γ 是 t 的可測函數，且 $|G(t, \gamma)| \leq m(t)$ 其中 $m(t)$ Lebesgue可積。自然，這時對(2.2)的解應理解為在Caratheódory意義下的廣義解^[1]。

附注4. 應用同樣的方法，引理中的不等號可以改變方向，不過這時最大解要改為最小解。

現在我們建立

基本定理.

- 假設 1) 方程(1.1)滿足條件(1.4)及(1.5)
- 2) 方程

$$\frac{dy}{dt} = \lambda(t)y + KG(t, y) \tag{2.7}$$

的經過點 $(t_0, K|x_0|)$ 的最大解 $y(t)$ 可以延拓到 $t_0 \leq t < t_0 + \alpha$ ，其中 $K|x_0| < H$ ， $\alpha > 0$ 是某常數或 $+\infty$ 。

則 方程(1.1)的經過點 (t_0, x_0) 的解 $x(t)$ 可以延拓到 $t_0 \leq t < t_0 + \alpha$ ，且

$$|x(t)| \leq y(t) \quad t_0 \leq t < t_0 + \alpha$$

證明. 1) 首先證明：如果 $x(t)$ ， $y(t)$ 都可以延拓到 $t_0 \leq t \leq t_0 + \beta$ ， $(\beta < \alpha)$ ，則在 $[t_0, t_0 + \beta]$ 上，有 $|x(t)| \leq y(t)$ 。事實上，由於 $x_0 \in D$ 在 t_0 的某一右鄰域上(1.6)成立，根據引理，必然存在 $h > 0$ ，使得在 $[t_0, t_0 + h]$ 上有 $|x(t)| \leq y(t)$ 。我們斷言 $h = \beta$ 。否則，如果 $h < \beta$ ，必有某一常數 $\delta > 0$ 存在，使得

$$\begin{aligned} |x(t)| &\leq y(t) & t_0 \leq t \leq t_0 + h \\ |x(t)| &> y(t) & t_0 + h < t < t_0 + h + \delta \end{aligned} \tag{2.8}$$

此時，在 $[t_0 + h, t_0 + \beta]$ 上仍有

$$\begin{aligned} |x(t)| &\leq K|x_0| e^{\int_{t_0}^t \lambda(t) dt} + K \int_{t_0}^t e^{\int_{\tau}^t \lambda(\xi) d\xi} G(\tau, |x(\tau)|) d\tau \\ &= K e^{\int_{t_0+h}^t \lambda(t) dt} \left\{ |x_0| e^{\int_{t_0}^{t_0+h} \lambda(t) dt} + \int_{t_0}^{t_0+h} e^{\int_{\tau}^{t_0+h} \lambda(\xi) d\xi} \right. \\ &\quad \left. G(\tau, |x(\tau)|) d\tau \right\} + K \int_{t_0+h}^t e^{\int_{\tau}^t \lambda(\xi) d\xi} G(\tau, |x(\tau)|) d\tau \end{aligned}$$

但

$$\begin{aligned} y(t_0+h) &= K|x_0|e^{\int_{t_0}^{t_0+h} \lambda(t)dt} + K \int_{t_0}^{t_0+h} e^{\int_{\tau}^{t_0+h} \lambda(\xi)d\xi} G(\tau, y(\tau)) d\tau \geq \\ &\geq K|x_0|e^{\int_{t_0}^{t_0+h} \lambda(t)dt} + K \int_{t_0}^{t_0+h} e^{\int_{\tau}^{t_0+h} \lambda(\xi)d\xi} G(\tau, |x(\tau)|) d\tau \end{aligned}$$

因而,

$$|x(t)| \leq y(t_0+h)e^{\int_{t_0+h}^t \lambda(t)dt} + K \int_{t_0+h}^t e^{\int_{\tau}^t \lambda(\xi)d\xi} G(\tau, |x(\tau)|) d\tau$$

应用引理, 存在 $h_1 > 0$, 使得

$$|x(t)| \leq y^*(t) \quad t \in [t_0+h, t_0+h+h_1]$$

其中 $y^*(t)$ 是 (2.7) 的过点 $(t_0+h, y(t_0+h))$ 的最大解。由最大解的唯一性, $y(t) \equiv y^*(t)$, 所以

$$|x(t)| \leq y(t) \quad t_0+h \leq t \leq t_0+h+h_1$$

这就与 (2.8) 矛盾。

2) 现设 $x(t)$ 只能延拓到 $t_0 \leq t < t_0 + \alpha^* < t_0 + \alpha$, 由刚才证明的 1), 得

$$|x(t)| \leq y(t) \quad t_0 \leq t < t_0 + \alpha^*$$

因为 $y(t)$ 可以延拓到 $t_0 \leq t < t_0 + \alpha^*$ 之外, 因而, $|x(t)| \leq \max_{[t_0, t_0 + \alpha^*]} y(t) < H$ 。由此

$x(t)$ 也可以延拓到 $t_0 \leq t < t_0 + \alpha^*$ 之外, 这就得到矛盾。这样, 就证明了 $x(t)$ 也可以延拓到 $t_0 \leq t < t_0 + \alpha$ 。再由 1) 即得

$$|x(t)| \leq y(t) \quad t_0 \leq t < t_0 + \alpha$$

基本定理证毕。

附注 1. 如果 $\lambda(t) \leq \mu(t)$, $t \geq t_0$, 则方程 (2.7) 可以代以方程

$$\frac{dy}{dt} = \mu(t)y + KG(t, y) \quad (2.7)'$$

事实上, 这时 (1.4) 可以代以

$$\left| \Gamma(t_0, t) \left[\Gamma(t_0, \tau) \right]^{-1} \right| \leq Ke^{\int_{\tau}^t \mu(t)dt} \quad t \geq \tau \geq t_0$$

附注2. 关于 $G(t, \gamma)$ 的連續假設參看引理的附注3, 更且, 我們还可以將 $G(t, \gamma)$ 对 γ 的連續性代以 $G(t, \gamma)$ 对 γ 的片段連續性, 这点附注对以后是有用的。

附注3. 适当选取 $\lambda(t)$ 及 $G(t, \gamma)$ 可以得到解的界的各种估計定理。例如取 $G(t, \gamma) = P(t)\gamma + Q(t)\gamma^\alpha$, 其中 $P(t), Q(t)$ 是 $t \geq t_0$ 的片段連續函数, $\alpha > 0$ 是常数, 即得^[6]中的定理1 (界的估計定理)。

基本定理是研究方程(1.1)的解的延拓性、有界性和稳定性的有力工具。关于延拓性, 我們容易利用之推得 Wintner^{[14][15]}的结果, 为了节省篇幅, 茲不贅述。本文后面将只利用之討論有界性和稳定性。

§3 解的有界性

我們建立(1.1)的解的有界性的判別法, 在本节中恒假設方程(1.1)滿足条件(1.4)和(1.5)且 $D = R^n$ 。

除了考察一般的有界性概念, 我們引进(1.1)的解最終有界(ultimate boundedness)的概念^[16]: 如果(1.1)的所有解有界, 且当 $t \rightarrow +\infty$ 时, 所有解都进入某一与初值无关的有界域, 則称(1.1)的解最終有界。

定理1. 如果方程(2.7) 在域 $t \geq t_0, \gamma \geq \gamma_0$ (其中 γ_0 为某一非負常数) 的所有解有界、最終有界, 則方程(1.1)的所有解有界、最終有界。

証明. 注意一阶方程(2.7)的最大解有如下性质:

$$y_1(t) \leq y_2(t)$$

其中 $y_i(t)$ ($i=1, 2$) 是經過点 (t_0, γ_i) 的最大解, $\gamma_1 \leq \gamma_2$ 。再根据基本定理, 即得定理1。

附注. 适当选取 $\lambda(t)$, $G(t, \gamma)$ 可以得到具体的有界性的判別法, 例如:

推論1. 設 1) $\lambda(t) = 0, \quad t \geq t_0$
2) $|f(t, x)| \leq M(t)L(|x|) \quad t \geq t_0, \quad x \in I^n$

其中 M, L 是片段連續函数, L 單調不降。

$$3) \int_{\gamma_0}^{\infty} \frac{ds}{L(s)} = \infty \quad \text{对某 } \gamma_0 > 0 \text{ 且 } \int_{t_0}^{\infty} M(s)ds < \infty$$

則(1.1)的所有解有界。

証明. 根据定理1, 只需証明方程

$$\frac{d\gamma}{dt} = KM(t)L(\gamma)$$

的經過点 $(t_0, \bar{\gamma}_0) \quad \bar{\gamma}_0 \geq \gamma_0$ 的解有界。事实上, 由

$$\int_{\gamma_0}^{\gamma} \frac{ds}{L(s)} = K \int_{t_0}^t M(s) ds$$

及条件 3) 知道这是对的。推论得证。

附注. 当 $L(\gamma) = \gamma$ 时, 就得 Bellman^[2] 的结果, 这说明 L 的线性条件是不必要的。如果条件 1) 改为 1') $\lambda(t) \leq 0, t \geq t_0$, 结论仍然成立。

推论 2. 设 1) $\lambda(t) = -\lambda, \lambda \geq 0$ 是常数
2) 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $R(\varepsilon) > 0$, 使得

$$|f(t, x)| \leq \begin{cases} N & \text{当 } |x| \leq R, \quad t \geq t_0 \\ \varepsilon|x| & \text{当 } |x| > R, \quad t \geq t_0 \end{cases}$$

其中 N 为常数。

则(1.1)的解最终有界。

证明. 选取 $\varepsilon < \frac{\lambda}{k}$, 又由条件 2) 总可以取 $R(\varepsilon) > \frac{NK}{\lambda}$

$$\text{令 } G(t, y) = \begin{cases} N & \text{当 } y \leq R, \quad t \geq t_0 \\ \varepsilon y & \text{当 } y > R, \quad t \geq t_0 \end{cases}$$

根据定理 1, 只需证明(2.7)的过点 (t_0, γ_0) $\gamma_0 > R$ 的解最终有界。

方程(2.7)的过点 (t_0, γ_0) $\gamma_0 > R$ 的解为

$$y(t) = \begin{cases} \gamma_0 e^{(-\lambda + K\varepsilon)(t-t_0)} & \text{当 } t_0 \leq t < t_1 \\ (R - \frac{NK}{\lambda})e^{-\lambda(t-t_1)} + \frac{NK}{\lambda} & \text{当 } t \geq t_1 \end{cases}$$

其中 t_1 由方程 $R = \gamma_0 e^{(-\lambda + K\varepsilon)(t_1-t_0)}$ 决定。

显然, 当 $t \rightarrow +\infty$ 时, 所有这些解都趋于 $\frac{NK}{\lambda}$, 因而(2.7)的解最终有界,

推论得证。

附注. 条件 1) 改为 1') $\lambda(t) \leq -\lambda, \lambda > 0$, 结论仍然成立。如果 $f(t, x) = 0(|x|)$, $|x| \rightarrow \infty$ 时, 对 t 一致成立, 推论的条件 2) 可以得到满足。

读者不难看出, 关于有界性的其他的更细致的概念^[17], 同样可以利用基本定理得到相应的结果。

§4 解的稳定性

在本节中, 假设(1.1)存在零解, 即假设 $f(t, 0) \equiv 0, t \geq t_0$ 。我们研究(1.1)的零解的稳定性。由于所研究问题的局部性质, 我们假设 $D = \left\{ x \mid |x| < H \right\}$

是原点的某一邻域, H 是給定的正常数。我們假設 (1.1) 滿足 (1.4) 和 (1.5) 且 $G(t, 0) = 0, t \geq t_0$ 。

定理2. 如果方程 (2.7) 的零解 (对 $\gamma_0 > 0$) 稳定、渐近稳定, 則方程 (1.1) 的零解也稳定、渐近稳定。

証明. 由定理条件, 任給 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得只要 $0 < \gamma_0 \leq \delta$ 則方程 (2.7) 的經過点 (t_0, γ_0) 的解 $y(t)$ 滿足

$$y(t) < \varepsilon \quad t \geq t_0 \quad (4.1)$$

应用基本定理, 取 $\delta' = \frac{\delta}{K}$, 則只要 $|x_0| \leq \delta'$, (1.1) 的經過点 (t_0, x_0) 的解 $x(t)$ 滿足

$$|x(t)| \leq y^*(t) \quad t \geq t_0$$

其中 $y^*(t)$ 是 (2.7) 經過点 $(t_0, K|x_0|)$ 的最大解, 由此及 (4.1)

$$|x(t)| < \varepsilon \quad t \geq t_0$$

因而 (1.1) 的零解稳定。应用基本定理, 同样可以証明渐近稳定性。

附注. 适当选取 $\lambda(t)$, $G(t, \gamma)$ 就可以得到⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁶⁾的一系列关于稳定性的結果。例如取 $G(t, \gamma) = P(t)\gamma + Q(t)\gamma^{1+a}$, 就得 (6) 中的結果。

推論1⁽⁶⁾. 設 1) $|f(t, x)| \leq P(t)|x| + Q(t)|x|^{1+a}, t \geq t_0, |x| < \eta \leq H$ 其中 $P(t), Q(t)$ 是 $t \geq t_0$ 的片段連續函数, $a > 0, \eta > 0$ 为常数

$$2) \int_{t_0}^{\infty} [\lambda(t) + KP(t)] dt < +\infty$$

$$3) \int_{t_0}^{\infty} Q(\tau) e^{a \int_{t_0}^{\tau} [\lambda(\xi) + KP(\xi)] d\xi} d\tau < +\infty$$

則 (1.1) 的零解稳定。

如将 2) 改为

$$2') \int_{t_0}^{\infty} [\lambda(t) + KP(t)] dt = -\infty$$

則 (1.1) 的零解渐近稳定。

証明. 根据定理2, 只要证明方程

$$\frac{dy}{dt} = [\lambda(t) + KP(t)]y + KQ(t)y^{1+a} \quad (4.2)$$

的零解对 $\gamma_0 > 0$ 在推論的条件下分别为稳定、渐近稳定。

但 (4.2) 是 Bernoulli 方程。解之得

$$y(t) = \gamma_0 e^{\int_{t_0}^t [\lambda(\tau) + KP(\tau)] d\tau} \left\{ 1 - \alpha \gamma_0^\alpha \right. \\ \left. K \int_{t_0}^t Q(\tau) e^{\alpha \int_{t_0}^{\tau} [\lambda(\xi) + KP(\xi)] d\xi} d\tau \right\}^{-\frac{1}{\alpha}}$$

由此可見，只要取 $\gamma_0 > 0$ 足夠小，即知在推論的條件下，(4.2) 的零解分別為穩定、漸近穩定。

附注. 再選定 $\lambda(t)$, $P(t)$, $Q(t)$ 就可以得到很多熟知的結果，我們不一一列出，只舉^[1]中的一條定理(p.318)為例：

- 設 1) $A(t) \equiv A$ 的特征根的實部全為負，
2) 任給 $\varepsilon > 0$ ，存在 $T \geq t_0$ 使得

$$|f(t, x)| \leq \begin{cases} k|x| + t^b|x|^{1+a} & t \leq T, |x| < \eta \\ \varepsilon|x| + t^b|x|^{1+a} & t > T, |x| < \eta \end{cases}$$

其中 k, a, b, η 為正常數，

則(1.1)的零解漸近穩定。

證明. 取 $\lambda(t) = -\lambda$, $\lambda > 0$ 又 $\varepsilon > \frac{\lambda}{K}$

$$P(t) = \begin{cases} k & t \leq T \\ \varepsilon & t > T \end{cases} \quad Q(t) = t^b$$

一眼看出，推論1的條件完全滿足，故(1.1)的零解漸近穩定。

推論2. 設 1) $\lambda(t) = 0$, $t \geq t_0$

$$2) |f(t, x)| \leq M(t)L(|x|) \quad t \geq t_0, |x| < \eta \leq H$$

其中 η 為常數， M, L 是片段連續函數， L 對 $\gamma > 0$ 單調不降。

$$3) L(0) = 0, \quad \lim_{\gamma_0 \rightarrow 0^+} \int_{\gamma_0}^{\gamma} \frac{ds}{L(s)} = \infty \quad \text{對 } \gamma > 0, \quad \int_{t_0}^{\infty} M(s) ds < \infty$$

則(1.1)的零解穩定。

證明. 應用定理2，只要證明方程

$$\frac{d\gamma}{dt} = KM(t)L(\gamma) \quad (4.3)$$

的零解對 $\gamma_0 > 0$ 穩定。

任給 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得

$$\int_{t_0}^{\infty} \frac{\varepsilon}{L(s)} ds > K \int_{t_0}^{\infty} M(s) ds$$

选取 $0 < \gamma_0 \leq \hat{\delta}$, 由

$$\int_{\gamma_0}^{\gamma} \frac{ds}{L(s)} = K \int_{t_0}^t M(s) ds$$

得知(4.3)的經過点 (t_0, γ_0) 的解 $\gamma(t)$ 满足

$$\gamma(t) < \varepsilon \quad t \geq t_0.$$

因而(4.3)的零解对 $\gamma_0 > 0$ 稳定。

附注. 令 $L(\gamma) = \gamma$, 又得(2)中的結果, 說明 L 的綫性条件是不必要的。条件1)改为1') $\lambda(t) \leq 0, t \geq t_0$ 。結論仍然成立。

讀者不难看出, 关于稳定性的更細致的概念(17), 同样可以利用本定理获得相应的結果。

最后指出, 如果注意到 § 1 中的附注, 应用本文的各个定理可以判別相当广泛类型的微分方程的解的有界性和稳定性。

参 考 文 献

- [1] E. A. Coddington and N. Levinson, Theory of Ordinary Differential Equations. 1955.
- [2] R. Bellman, 微分方程的解的稳定性理論 科学出版社 1957.
- [3] L. Cesari, Asymptotic Behavior and Stability Problems in Ordinary Differential Equations. 1959.
- [4] G. Sansone, Обыкновенные Дифференциальные Уравнения. Москва 1954.
- [5] 李岳生 基本不等式与微分方程解的唯一性(I) 吉林大学自然科学学报 1 (1960) 7—34.
- [6] 李岳生 非綫性微分方程的解的界, 稳定性和誤差估計《数学学报》12 (1962) 32—39.
- [7] С. М. Лозинский, Оценка погрешности численного интегрирования обыкновенные дифференциальные уравнения, Изв. Высших Заведений. Математика 5 (1958) 52—90.
- [8] I. Bilari, A Generalization of a Lemma of Bellman and its Application to Uniqueness Problems of Differential Equations. Acta Math.

- Acad. Sci Hungar. 7 (1956) 81—94.
- [9] V. Lakshmikanth, On the Boundedness of Solutions of Nonlinear Differential Equations. Proc. Amer. Math. Soc. 8 (1957) 1044—1048.
- [10] C. E. Langenhop, Bounds on the Norm of a Solution of a General Differential Equation. Ibid. 11 (1960) 795—799.
- [11] B. Viswanatham, A Generalization of Bellman's Lemma. Ibid. 14 (1963) 15—18.
- [12] F. Brauer, Bounds for Solutions of Ordinary Differential Equations. Ibid. 14 (1963) 36—43.
- [13] F. Brauer, Global Behavior of Solutions of Ordinary Differential Equations. J. Math. Anal. App. 2 (1961) 145—159.
- [14] A. Wintner, The Nonlocal Existence Problems of Ordinary Differential Equations. Amer. J. Math. 67 (1945) 277—284.
- [15] A. Wintnes, Ordinary Differential Equations and Laplace Transforms (appendix). Ibid. 79 (1957) 265—294.
- [16] A. Stokes, The Applications of a Fixed Point Theorem to a Variety of Nonlinear Stability Problems. Contrib. Theory Nonlinear Oscillations 5 (1960) 173—184.
- [17] H. A. Antosiewicz, A Survey of Lyapunov's Second Method. Ibid. 4 (1958) 141—166.

Boundedness and Stability of Solutions of Nonlinear Systems of Differential Equations

Chow Chi-ming

Abstract

In the present paper, we study the boundedness and stability of solutions of the following n -dimensional system of differential equations:

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x + f(t, x) \quad x(t_0) = x_0 \quad (1.1)$$

where $A(t)$ is a continuous $n \times n$ matrix for $t \geq t_0 \geq 0$ and $f(t, x)$ is a con-

tinuous vector function for $t \geq t_0$, $x \in D = \{x \mid |x| < H\} \subset \mathbb{R}^n$.

Let

$$|Y(t_0, t)(Y(t_0, \tau))^{-1}| \leq K e^{\int_{\tau}^t \lambda(t) dt} \quad t \geq \tau \geq t_0 \quad (1.4)$$

where $Y(t_0, t)$ is a standard fundamental matrix of the linear system

$$\frac{dy}{dt} = A(t)y \quad (1.3)$$

$K \geq 1$ is a constant and $\lambda(t)$ is continuous for $t \geq t_0$.

$$|f(t, x)| \leq G(t, |x|) \quad t \geq t_0, \quad x \in D \quad (1.5)$$

where $G(t, \gamma)$ is continuous for $t \geq t_0$, $0 \leq \gamma < H$ and nondecreasing in γ for fixed t .

In §2, we prove a fundamental inequality with which we obtain the following fundamental theorem.

FUNDAMENTAL THEOREM. Assume 1) (1.1) satisfies the conditions (1.4) and (1.5); 2) the maximum solution $y(t)$ of the equation

$$\frac{dy}{dt} = \lambda(t)y + KG(t, y) \quad (2.7)$$

passing through $(t_0, K|x_0|)$ can be continued to the interval $(t_0, t_0 + \alpha)$, where $K|x_0| < H$ and $\alpha > 0$ is a certain constant or $+\infty$. Then the solution of (1.1) passing through (t_0, x_0) can be continued to the interval $(t_0, t_0 + \alpha)$ and

$$|x(t)| \leq y(t) \quad \text{for } t \in [t_0, t_0 + \alpha)$$

In §3, §4, we use the fundamental theorem to obtain some rather general criteria for boundedness and stability of solutions of (1.1) which include a series of results concerned [1] [2] [3] [6], and in this manner one may see the internal relation between these results. In this paper we also come to a similar result obtained by Stokes [16] which relies on a fixed point theorem for locally convex topological linear space due to Tychonoff.